



Informe semanal de Vigilancia de la Gripe en España

Semana 11/2012 (12 – 18 de marzo 2012)

Nº 301. 22 de marzo de 2012

La gripe próxima a finalizar su periodo epidémico en España

- Vigilancia epidemiológica: Sistemas centinela
- Vigilancia virológica
- Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe
- Mortalidad relacionada con gripe
- Vigilancia internacional de la gripe

- En la semana 11/2012 la tasa global de incidencia de gripe desciende a 57,48 casos por 100.000, situándose muy cerca del umbral basal de esta temporada.
- La incidencia de gripe disminuye en todos los grupos de edad.
- El porcentaje de muestras centinela positivas a virus gripales disminuye a 30,4% aunque mantiene niveles propios del periodo epidémico.
- Persiste una circulación mayoritaria del virus de la gripe A(H3) en el territorio sujeto a vigilancia, con una creciente contribución de virus de la gripe B (25%).
- Desde la semana 40/2011 se han notificado 531 casos graves hospitalizados confirmados de gripe en dieciséis CCAA, un 96% por virus de la gripe A (99% de A(H3), entre los subtipados) y un 4% por virus B.
- Desde el inicio de la temporada 2011-12 se han registrado 30 defunciones en casos graves hospitalizados confirmados de gripe, el 90% mayores de 44 años.
- Persiste la actividad gripal en la región templada del hemisferio norte, con aumento en el norte de América, norte de China y varios países europeos. Ciertos países del sur de Europa y norte de África han alcanzado el pico de su onda gripal de esta temporada, así como Japón y la República de Corea. La circulación mayoritaria es de A(H3), a excepción de Méjico, donde ha circulado de manera predominante el virus de la gripe A(H1N1)pdm09, y China, donde ha predominado el tipo B. En Canadá y en Europa en las últimas semanas se han incrementado las detecciones de virus tipo B.

Información adicional sobre la vigilancia de gripe en España puede consultarse en la Web del [SVGE](#) y [aquí](#)


Vigilancia epidemiológica: Sistemas centinela

En la semana 11/2012, se ha recibido información de vigilancia de gripe de todas las redes centinela integradas en el Sistema de Vigilancia de la gripe en España (SVGE). La actividad gripal muestra una evolución decreciente en la mayoría del territorio sujeto a vigilancia. En las redes de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, Ceuta y Melilla, las tasas de incidencia de gripe han tomado de nuevo valores pre-epidémicos, por debajo del umbral basal, mientras que en el resto de redes centinela la actividad gripal se aproxima al fin del periodo epidémico de esta temporada. La actividad gripal sigue asociada a una circulación mayoritaria del virus de la gripe A(H3) de forma generalizada.

A nivel global la tasa de incidencia notificada de gripe desciende a 57,48 casos por 100.000 (Razón de tasas: 0,69; IC 95%:0,62-0,77), siendo este valor muy próximo al umbral basal post-epidémico (Figura 1). Se señala un nivel medio de intensidad de actividad gripal, un nivel regional de difusión y una evolución decreciente.

En su distribución por grupos de edad se observa una disminución en las tasas de incidencia de gripe en todos los grupos de edad, significativa en los menores de 65 años (Figura 2).


Figura 1. Tasa de incidencia semanal de gripe y número de detecciones virales. Temporada 2011-12. Sistemas centinela. España



Fuente: CNE. Sistema de Vigilancia de Gripe en España


En el mapa de la difusión espacio-temporal de la incidencia de gripe de la semana 11/2012 se mantiene una disminución generalizada de la incidencia de gripe en todo el territorio. Las tasas más altas se observan en algunas zonas de Cataluña y noroeste de Extremadura, así como en la franja norte peninsular (Figura 3). Más información sobre el análisis geográfico de la incidencia de gripe puede consultarse [aquí](#)

Figura 2. Evolución de la incidencia de la gripe por grupos de edad. Temporada 2011-12. Sistemas centinela. España



Fuente: CNE. Sistema de Vigilancia de Gripe en España

Figura 3. Difusión geográfica de la incidencia de gripe. Semana 11/2012. Sistemas centinela



Fuente: CNE. Sistema de Vigilancia de Gripe en España

En la semana 11/2012, de las 158 muestras centinela enviadas a los laboratorios del sistema, 48 han sido positivas (30,4%). La tasa de detección viral mantiene una tendencia decreciente desde las semana 06-07/2012 de esta temporada (Figura 4).

De las 48 detecciones de virus de la gripe notificadas por el sistema centinela esta semana, 29 (60,4%) son del tipo viral A y 19 (39,6%) del B. De los 18 (62,1%) virus A subtipados, todos eran A(H3). Además, se han notificado 46 detecciones no centinela, 41 (89,1%) de gripe A y 5 (10,9%) de gripe B. En total (centinela y no centinela) esta semana se identifica un 74,5% de virus A y un 25,5% de virus B. El porcentaje de virus de la gripe B ha aumentado desde 2,6% en la semana 03/2012 hasta 25,5% en la semana 11/2012.


Desde el inicio de la temporada se han notificado 3.851 detecciones de virus de la gripe, 2.730 centinela (71%) y 1.121 no centinela (29%). De ellos 3.667 (95,2%) han sido virus de la gripe A, 178 (4,6%) virus B y 6 (0,2%) virus C. De los 3.249 (89%) virus A subtipados, 3.244 (99,8%) han sido A(H3) y cinco (0,2%) A(H1N1)pdm09.

En la figura 5 se observan las caracterizaciones genéticas de los virus de la gripe en la temporada 2011-12. Basándose en el estudio de la hemaglutinina, desde el inicio de la temporada 2011-12, el Centro Nacional de Gripe del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (Majadahonda, Madrid) ha caracterizado genéticamente 318 cepas (299 H3, 4 H1 y 15 B). El análisis filogenético muestra que 195 virus A(H3) son similares a la cepa A/Stockholm/18/2011, 101 virus A(H3) son similares a la cepa A/Iowa/19/2010, y 3 virus A(H3) son similares a la cepa A/Perth/10/2010(H3N2). Uno de los virus A (H1) caracterizados es similar a la cepa A/Astrakhan/1/2011, otro es similar a la cepa A/St Petersburg/27/2011 y los otros son similares a A/St Petersburg/100/2011. En lo que respecta a los virus B caracterizados, 13 de ellos son del linaje Yamagata (12 B/Bangladesh/3333/2007 y 1 B/Brisbane/3/2007), y dos son del linaje Victoria, estos últimos similares a B/Brisbane/60/2008, incluido en la vacuna de esta temporada. Asimismo el Centro de Gripe de la OMS del Hospital Clínico de Barcelona ha caracterizado genéticamente 49 cepas (37 A(H3) y 12 B). El análisis filogenético muestra que 28 de los virus A(H3) son similares a la cepa A/Stockholm/18/2011 y 9 de los virus A(H3) son similares a la cepa A/Iowa/19/2010. Los dos virus B caracterizados son similares a B/Bangladesh/3333/2007 (linaje Yamagata), distintos a la cepa de virus B incluida en la vacuna.

La mayoría de los virus A(H3) caracterizados están incluidos en el grupo genético representado por la cepa A/Stockholm/18/2011 de la que se acumulan evidencias de diversidad antigénica con respecto a cepa vacunal A/Perth/16/2009 (H3N2). Más detalles sobre la caracterización genética y antigénica de los virus circulantes puede consultarse en el último informe realizado por el CNRL-ECDC ([Febrero 2012](#)).


En la semana 11/2011 la tasa de detección de VRS es del 4% (Figura 6). El pico de positividad de VRS se alcanzó en la semana 52/2011 (51%). A partir de entonces la tasa de detección de VRS ha disminuido constantemente. La tasa de detección de virus de la gripe aumentó desde 39%, en la semana 01/2012, hasta 70% en la semana 06/2012, disminuyendo la intensidad de circulación viral a partir de esa semana. Más información sobre la vigilancia de VRS puede consultarse [aquí](#).

Figura 4. Muestras centinela analizadas y porcentaje de positivos por tipo/subtipo de virus de la gripe. Temporada 2011-12. España




Fuente: CNE. Sistema de Vigilancia de Gripe en España

Figura 5. Caracterizaciones genéticas de detecciones de virus de la gripe. Temporada 2011-12. España



Fuente: Sistema de Vigilancia de Gripe en España

Figura 6. Tasa de detección de virus de la gripe y VRS (%). Temporada 2011-12. España



Fuentes: Los datos de gripe provienen de las redes centinela de SVGE y los de VRS de los laboratorios de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla León, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja y Ceuta.


Vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe

El protocolo de vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe puede consultarse en el siguiente enlace del [ISCIII](#)

Desde el inicio de la temporada 2011-2012 se han notificado 531 casos graves hospitalizados confirmados de gripe por 16 CCAA (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja) de los que 56% son hombres y 44% mujeres. La distribución por grupos de edad se observa en la figura 7. El mayor número de casos se registra en los mayores de 64 años (41%), seguido de los menores de 5 años (29%). En la figura 8 se observa el número de casos graves hospitalizados confirmados de gripe por tipo/subtipo de virus y semana de hospitalización. El 96% (511) de los casos correspondieron a infecciones por el virus de la gripe A y el 4% (19) a virus B. El 99% de las detecciones subtipadas son virus A(H3) y el 1% virus A(H1N1)pdm09.


Con la información disponible hasta el momento se observa que 284 casos (78%) presentaban factores de riesgo de complicaciones de gripe. Entre los factores de riesgo más frecuentes destacan la enfermedad pulmonar crónica (26%), la enfermedad cardiovascular crónica (24%) y la diabetes (19%). De los que pertenecen a los grupos elegibles para vacunación y se dispone de información, 118 casos (47%) habían recibido la vacuna antigripal de esta temporada. Como complicaciones más frecuentes, el 62% de los casos presentaron neumonía y el 29% coinfección. Del total de casos hospitalizados 179 (38%) ingresaron en UCI.

Figura 7. Porcentaje de casos graves hospitalizados confirmados de gripe por grupos de edad. Temporada 2011-12. España



Fuente: CNE. SVGE. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Figura 8. Casos graves hospitalizados confirmados de gripe por tipo/subtipo de virus. Temporada 2011-12. España




Fuente: CNE. SVGE. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Mortalidad relacionada con gripe

Defunciones en casos graves hospitalizados confirmados de gripe

Desde el inicio de la temporada 2011-12 se han registrado 30 defunciones en casos graves hospitalizados confirmados de gripe en nueve CCAA (Figura 9). El 57% eran hombres y el 43% mujeres. Veintisiete de los casos (90%) eran mayores de 44 años, dos casos de 15-44 años y uno de 5-14 años. En 29 (97%) de los casos se confirmó infección por virus de la gripe A y en el otro (3%) virus tipo B, siendo el 100% de los subtipados A(H3). En los casos en los que se dispone de información, el 92% (23/25) presentaban algún factor de riesgo de complicaciones de gripe y el 50% de los casos (10/20) habían recibido la vacuna antigripal de esta temporada.

Figura 9. Defunciones en casos graves hospitalizados confirmados de gripe y tasa de gripe. Temporada 2011-12. España



Fuente: CNE. SVGE. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Excesos de mortalidad diaria por todas las causas

La generación de los informes del sistema de monitorización de la mortalidad diaria en el CNE está interrumpida temporalmente. Lamentamos los inconvenientes.

Situación en Europa

Durante la temporada 2011-12 la onda epidémica de la actividad gripal se ha iniciado más tardíamente que en temporadas previas, sin una clara progresión geográfica.

En la semana 10/2012, 26 países han notificado datos clínicos. La intensidad de la actividad gripal fue baja en cinco países, media en 17 países, alta en Portugal y Suecia, y muy alta en Grecia. La difusión geográfica de la actividad gripal fue epidémica en 13 países, regional en seis, local en dos, esporádica en cuatro, y nula en Chipre y Polonia. La actividad gripal se ha incrementado en Holanda, Letonia y Rumania, al tiempo que 13 países notifican una tendencia estable y diez decreciente.

De las 1.433 muestras centinela analizadas durante la semana 10/2012, 619 (43%) fueron positivas para virus gripales. Del total de detecciones (centinela y no centinela), el 93,8% fueron de tipo A y 6,2% de tipo B. Desde el inicio de la temporada 2011-12, el 95,5% de los virus de la gripe notificados fueron del tipo A y el 4,5% del tipo B. El 97,5% de los virus de la gripe A que se subtiparon fueron A(H3) y el 2,5% A(H1N1)pdm09. De los 134 virus B analizados 70 (54,5%) son del linaje Victoria y 61 (45,5%) del linaje Yamagata.

Desde la semana 40/2011, se han caracterizado antigénicamente 522 virus de la gripe, de los que 452 (86,6%) son similares a A/Perth/16/2009 (H3N2). Así mismo se han caracterizado genéticamente 661 virus, de los que el 86,9% son virus A(H3). El 55% está incluidos en el clado A/Victoria/208/2009, dentro del grupo genético 3 representado por la cepa A/Stockholm/18/2011 que presenta diversidad antigénica con respecto a cepa vacunal A/Perth/16/2009(H3N2).

Los virus analizados no han presentado hasta el momento resistencias a oseltamivir o zanamivir, pero todos mantienen resistencias a los inhibidores M2.

Desde la semana 40/2011 se han notificado 873 casos graves confirmados de gripe, de los cuales 850 (97%) fueron tipo A [34 (6,2%) A(H1N1)pdm09, y 518 (93,8%) A(H3), entre los subtipados], y 23 (3%) tipo B.

Durante la semana 10/2012 no se han notificado al ECDC casos de gripe en humanos de origen animal en países de la Unión Europea. La [OMS](#) recomienda la notificación de los posibles casos.

Para más información consultar [ECDC](#), [EuroFlu.org](#) (16 de marzo de 2012)

Situación en el Mundo

Persiste la actividad gripal en la región templada del hemisferio norte, con aumento en el norte de América, norte de China y varios países europeos. Ciertos países del sur de Europa y norte de África han alcanzado el pico de su onda gripal de esta temporada, así como Japón y la República de Corea.

La mayoría de los países de la zona tropical informan de actividad gripal baja, así como los países del hemisferio sur que se sitúan en niveles típicos intertemporada.

En la región templada del hemisferio norte la circulación mayoritaria es de A (H3), a excepción de Méjico y Centroamérica, donde ha circulado de manera predominante el virus de la gripe A(H1N1)pdm09, y China, donde ha predominado el tipo B.

Las resistencias a oseltamivir son muy bajas y no han experimentado un incremento con relación a temporadas previas.

Para más información consultar en [OMS](#) (16 de marzo de 2012)

EUA: Durante la semana 10/2012 la actividad gripal aumentó ligeramente, aunque persisten niveles bajos. El porcentaje de muestras positivas para gripe fue del 21,3%. Un 94,7% de los virus fueron del tipo A (40,2% A(H3); 21,9% A(H1N1)pdm09; 37,9% no subtipado) y el 5,3 % del tipo B. La proporción de defunciones atribuidas a gripe y neumonía están por debajo del umbral epidémico. En la semana 10/2012 se ha notificado una defunción pediátrica relacionada con gripe A(H3). Más información en [FluView \(CDC\)](#)

Canadá: Continúa el aumento de la actividad gripal con respecto a semanas previas. En la semana 10/2012 se han notificado 31 brotes relacionados con gripe (21 en centros de cuidados de larga estancia, 1 en colegios, 2 en un hospital y 7 en otros). De las 1.080 detecciones notificadas, 10,8% fueron A(H3), 8,4% A(H1N1)pdm09, 29,1% A no subtipado y 51,7% virus B. Continúa incrementándose el porcentaje de detecciones de virus B. El 49% de los casos graves relacionados con gripe se ha producido en edades pediátricas y de estos el 49% han sido por virus de la gripe tipo B. Más información en [FluWatch](#)

Gripe aviar: Desde finales de 2003, y hasta el 7 de marzo de 2012, se han confirmado 597 casos por la OMS, con 351 defunciones en un total de 15 países. En el período transcurrido de 2012 se ha notificado 19 casos y 11 defunciones. Las últimas dos defunciones se han producido en una mujer de 24 años en Indonesia y otra de 40 años en Egipto, ambas habían estado en contacto con aves de corral enfermas. La última tabla actualizada puede consultarse [aquí](#)

Nota informativa: la suscripción a la lista de distribución del Informe semanal de vigilancia de gripe se puede realizar en la página del SVGE. Las personas suscritas recibirán periódicamente el informe publicado los jueves de cada semana, durante el periodo habitual de vigilancia, y cada dos semanas en el periodo estival. La suscripción se puede realizar a través del siguiente enlace [SVGE](#).

En la elaboración de este Informe ha participado el Grupo de Vigilancia de Gripe, el Grupo de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Área de Vigilancia de la Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos III) y el Laboratorio de gripe y virus respiratorios del Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III). Este informe es el resultado del trabajo de todos los integrantes del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE): médicos centinela, epidemiólogos de las redes centinela, virólogos de los laboratorios integrados en el SVGE y laboratorios asociados, profesionales de los hospitales participantes en la vigilancia de los casos graves hospitalizados confirmados de gripe, responsables epidemiológicos y virológicos de cada red y coordinadores epidemiológicos y virológicos del SVGE (CNE y CNM, ISCIII). Cualquier pregunta relacionada con este informe debe dirigirse a: alarrauri@isciii.es, cdeIqados@isciii.es o sjimenez@isciii.es

Este informe se puede consultar en la página del [SVGE](#) y en la página del Instituto de Salud Carlos III ([ISCIII](#))