

Informe nº 55. Situación de COVID-19 en España. Casos diagnosticados a partir 10 de mayo

Informe COVID-19 . 02 de diciembre de 2020



Contenido

Introducción	3
Nota metodológica	3
Casos de COVID-19 en España notificados a la RENAVE con inicio de síntomas y diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020	5
Comparación de los indicadores de gravedad entre los casos notificados antes y después de la entrada en vigor de la nueva Estrategia de Vigilancia y Control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19 (11 de mayo de 2020)	16
Observaciones	17
Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas, MoMo	18

Introducción

En diciembre de 2019 surgió un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei, China), con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo virus de la familia *Coronaviridae* que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2¹. La secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. La enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso internacional COVID-19. El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020. Posteriormente, la OMS lo reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020.

Este informe contiene el análisis de los casos de COVID-19 notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a partir del 11 de mayo de 2020, debido a la entrada en vigor de la nueva Estrategia de Vigilancia y Control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19, a través de la plataforma SiViES (Sistema para la Vigilancia en España), que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología conforme a los criterios establecidos en el protocolo de vigilancia en cada momento. Este informe refleja la información suministrada por las CCAA a la RENAVE. La extracción de datos se ha realizado el **2 de diciembre de 2020 a las 16:45 h.**

Nota metodológica

Desde el principio de la pandemia de COVID-19, la vigilancia de los casos de esta enfermedad en España se basa en la notificación universal de todos los casos confirmados de COVID-19 que se identifican en cada CCAA. Las CCAA realizan una notificación individualizada de casos de COVID-19 a la RENAVE a través de la plataforma informática vía Web SiViES que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología (CNE). Esta información procede de la encuesta epidemiológica de caso que cada CA cumplimenta ante la identificación de un caso de COVID-19. El contenido de la encuesta se ha ido modificando conforme a las prioridades en cada momento. Inicialmente contenía una mayor cantidad de datos, epidemiológicos y clínicos de los casos de COVID-19 identificados en España. A partir del 11 de mayo de 2020, debido a la entrada en vigor de la nueva Estrategia de Vigilancia y Control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19, hubo un cambio en la notificación de las CCAA al Ministerio de Sanidad, simplificando la encuesta para hacerla más ágil. Los casos confirmados serán de declaración obligatoria urgente al nivel estatal siguiendo la encuesta del Anexo 1 de dicha Estrategia. La encuesta incluye información clínico-epidemiológica consensuada y aprobada por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y la RENAVE.

Para conseguir una información completa de cada caso, la CA debe realizar sucesivas actualizaciones de la información de la encuesta porque no siempre toda la información está disponible desde la identificación del caso, o precisa de una actualización según cambia la evolución clínica del paciente. Las actualizaciones de la información de los casos las realizan las CCAA, según disponen de ellas, en la plataforma SiViES.

Los objetivos actuales de esta vigilancia son:

1. **Conocer la incidencia de la enfermedad de manera consistente** con la evolución de la pandemia y a partir de una fuente única que informe de los casos de COVID-19 en España por nivel de gravedad.

¹ <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>
Situación de COVID-19 en España a 2 de diciembre de 2020. Equipo COVID-19. RENAVE. CNE. CNM (ISCIII)

2. Obtener los **indicadores** que informarán sobre la situación epidemiológica de la COVID-19 y su distribución geográfica en España.
3. Obtener información oportuna que guíe la respuesta precoz ante la epidemia de COVID-19.

Es importante resaltar que todos los resultados son provisionales y deben interpretarse con precaución, porque se ofrece información de cada variable con la información disponible para cada una de ellas en el momento de la extracción de datos. Estos resultados pueden variar con cada informe por la dinámica propia de declaración de datos por las CCAA a la RENAVE a través de SiViES. En el caso de “hospitalización”, “UCI” y “defunción”, hemos considerado como “no hospitalización”, “no UCI” y “no defunción” los casos sin información en esta variable, y deben ser confirmados en posteriores análisis.

El análisis se ha realizado con todos los casos notificados a la RENAVE con fecha de diagnóstico posterior al 10 de mayo. La fecha utilizada para la presentación de los casos fue la fecha de inicio de síntomas, y en su defecto, la fecha de diagnóstico menos tres días (mediana entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico). En aquellos casos en los que no se dispone de fecha de inicio de síntomas ni de diagnóstico se utiliza la fecha clave (fecha para estadísticas). En los casos asintomáticos se ha utilizado la fecha de diagnóstico.

Casos de COVID-19 en España notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Tabla 1. Incidencia acumulada en las tres últimas semanas epidemiológicas y razón de tasas semanales por grupos de edad. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Grupo de edad	Nº casos	Semana 46		Semana 47		Semana 48*		Razón de tasas semanales (IC95%)	
		N	IA	N	IA	N	IA	Semana 47/46	Semana 48/47*
<15	174177	12852	186,7	9626	139,8	6102	88,6	0,75 (0,73-0,77)	0,63 (0,61-0,65)
15-29	295097	17930	249,2	12626	175,5	7699	107,0	0,70 (0,69-0,72)	0,61 (0,59-0,63)
30-39	205665	12812	201,7	9002	141,7	5611	88,3	0,70 (0,68-0,72)	0,62 (0,60-0,64)
40-49	240934	16723	213,5	11930	152,3	7314	93,4	0,71 (0,70-0,73)	0,61 (0,60-0,63)
50-59	205727	15284	221,4	10514	152,3	6310	91,4	0,69 (0,67-0,71)	0,60 (0,58-0,62)
60-69	128051	9837	189,2	6814	131,1	4048	77,9	0,69 (0,67-0,71)	0,59 (0,57-0,62)
70-79	81466	6414	169,1	4682	123,4	2896	76,3	0,73 (0,70-0,76)	0,62 (0,59-0,65)
≥80	91559	7760	270,9	5646	197,1	3981	139,0	0,73 (0,70-0,75)	0,71 (0,68-0,73)
Total	1432072	100385	213,5	71389	151,8	44417	94,5	0,71 (0,70-0,72)	0,62 (0,61-0,63)

Casos por fecha de inicio de síntomas y en su ausencia fecha de diagnóstico menos 3 días, por grupo de edad y semana (última, penúltima y antepenúltima). IA: incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes). *Los datos de las dos últimas semanas (número de casos, incidencia acumulada y razón de tasas), especialmente de la última semana, pueden no estar consolidados debido a diferentes aspectos relacionados con la dinámica de declaración a la RENAVE, y pueden variar en futuros informes.


Tabla 2. Incidencia acumulada en las tres últimas semanas epidemiológicas y razón de tasas semanales por CCAA. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Comunidad autónoma	Nº casos	Semana 46		Semana 47		Semana 48*		Razón de tasas semanales (IC95%)	
		N	IA	N	IA	N	IA	Semana 47/46	Semana 48/47*
Andalucía	223012	23923	284,3	16136	191,8	7731	91,9	0,67 (0,66-0,69)	0,48 (0,47-0,49)
Aragón	68427	3436	260,4	2263	171,5	1825	138,3	0,66 (0,62-0,69)	0,81 (0,76-0,86)
Asturias	21355	3291	321,8	2131	208,3	1285	125,6	0,65 (0,61-0,68)	0,60 (0,56-0,65)
Baleares	22769	1358	118,1	1710	148,8	1489	129,5	1,26 (1,17-1,35)	0,87 (0,81-0,93)
Canarias	19041	822	38,2	750	34,8	764	35,5	0,91 (0,83-1,01)	1,02 (0,92-1,13)
Cantabria	13389	1462	251,6	937	161,3	696	119,8	0,64 (0,59-0,70)	0,74 (0,67-0,82)
Castilla-La Mancha	69391	4437	218,3	3197	157,3	2027	99,7	0,72 (0,69-0,75)	0,63 (0,60-0,67)
Castilla y León	103270	9194	383,2	5620	234,2	2721	113,4	0,61 (0,59-0,63)	0,48 (0,46-0,51)
Cataluña	253600	15182	197,8	10234	133,3	6770	88,2	0,67 (0,66-0,69)	0,66 (0,64-0,68)
C. Valenciana	93983	8492	169,7	7305	146,0	4428	88,5	0,86 (0,83-0,89)	0,61 (0,58-0,63)
Extremadura	25852	1972	184,7	1292	121,0	1005	94,1	0,66 (0,61-0,70)	0,78 (0,72-0,84)
Galicia	41755	3879	143,7	3306	122,5	2180	80,8	0,85 (0,81-0,89)	0,66 (0,62-0,70)
Madrid	283635	9572	143,7	7885	118,3	5799	87,0	0,82 (0,80-0,85)	0,74 (0,71-0,76)
Murcia	53080	3802	254,5	2065	138,2	1207	80,8	0,54 (0,51-0,57)	0,58 (0,54-0,63)
Navarra	34614	1329	203,1	941	143,8	693	105,9	0,71 (0,65-0,77)	0,74 (0,67-0,81)
País Vasco	85335	6937	314,2	4611	208,9	3174	143,8	0,66 (0,64-0,69)	0,69 (0,66-0,72)
La Rioja	12841	899	283,8	663	209,3	470	148,4	0,74 (0,67-0,82)	0,71 (0,63-0,80)
Ceuta	2729	189	222,9	163	192,3	61	72,0	0,86 (0,70-1,06)	0,37 (0,28-0,50)
Melilla	3994	209	241,7	180	208,1	92	106,4	0,86 (0,71-1,05)	0,51 (0,40-0,66)
Total	1432072	100385	213,5	71389	151,8	44417	94,5	0,71 (0,70-0,72)	0,62 (0,61-0,63)

Casos por fecha de inicio de síntomas y en su ausencia fecha de diagnóstico menos 3 días, por grupo de edad y semana (última, penúltima y antepenúltima). IA: incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes). *Los datos de las dos últimas semanas (número de casos, incidencia acumulada y razón de tasas), especialmente de la última semana, pueden no estar consolidados debido a diferentes aspectos relacionados con la dinámica de declaración a la RENAVE, y pueden variar en futuros informes.


Figura 1. Incidencia acumulada en los últimos 14 días por CCAA y total España. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Figura 1a



Los datos de las últimas semanas, especialmente de la última semana, no están consolidados debido a diferentes aspectos relacionados con la dinámica de declaración a la RENAVE. La línea roja discontinua indica los días en los que se estima una posible variación del 10% entre la IA calculada con los datos disponible hasta el momento y la real. La variación del 10% se ha estimado analizando el número de días que transcurren entre la notificación del caso a la CCAA y la fecha de inicio de síntomas, utilizando extracciones de SiViES de los últimos 15 días. En ausencia de fecha de inicio de síntomas, se usa la fecha de diagnóstico menos 3 días, en los casos sintomáticos, y la fecha de diagnóstico, en los casos asintomáticos.

Figura 1b



Los datos de las últimas semanas, especialmente de la última semana, no están consolidados debido a diferentes aspectos relacionados con la dinámica de declaración a la RENAVE. La línea roja discontinua indica los días en los que se estima una posible variación del 10% entre la IA calculada con los datos disponible hasta el momento y la real. La variación del 10% se ha estimado analizando el número de días que transcurren entre la notificación del caso a la CCAA y la fecha de inicio de síntomas, utilizando extracciones de SiViES de los últimos 15 días. En ausencia de fecha de inicio de síntomas, se usa la fecha de diagnóstico menos 3 días, en los casos sintomáticos, y la fecha de diagnóstico, en los casos asintomáticos.

Tabla 3. Casos de COVID-19 por nivel de gravedad notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020. Distribución por CCAA y total España

Comunidad Autónoma	Casos totales	Hospitalizados ¹	UCI ¹	Defunciones ¹
Andalucía	223012	14492 (6,5)	1071 (0,5)	2747 (1,2)
Aragón	68427	6260 (9,1)	464 (0,7)	1443 (2,1)
Asturias	21355	3303 (15,5)	200 (0,9)	703 (3,3)
Baleares	22769	1391 (6,1)	196 (0,9)	183 (0,8)
Canarias	19041	1664 (8,7)	307 (1,6)	178 (0,9)
Cantabria	13389	703 (5,3)	55 (0,4)	109 (0,8)
Castilla-La Mancha	69391	2988 (4,3)	253 (0,4)	843 (1,2)
Castilla y León	103270	9105 (8,8)	693 (0,7)	1805 (1,7)
Cataluña	253600	7782 (3,1)	592 (0,2)	1441 (0,6)
C. Valenciana	93983	7417 (7,9)	688 (0,7)	938 (1,0)
Extremadura	25852	1862 (7,2)	162 (0,6)	441 (1,7)
Galicia	41755	3586 (8,6)	425 (1,0)	611 (1,5)
Madrid	283635	14169 (5,0)	687 (0,2)	2722 (1,0)
Murcia	53080	4111 (7,7)	531 (1,0)	468 (0,9)
Navarra	34614	2098 (6,1)	213 (0,6)	356 (1,0)
País Vasco	85335	3456 (4,0)	309 (0,4)	1010 (1,2)
La Rioja	12841	1183 (9,2)	137 (1,1)	189 (1,5)
Ceuta	2729	171 (6,3)	17 (0,6)	51 (1,9)
Melilla	3994	259 (6,5)	40 (1,0)	40 (1,0)
Total España	1432072	86000 (6,0)	7040 (0,5)	16278 (1,1)

¹ n (%) calculado sobre el total de casos en cada CCAA

Tabla 4. Casos de COVID-19 por nivel de gravedad notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020. Distribución por grupo de edad

Grupo de edad (años)	Casos totales	Hospitalizados ¹	UCI ¹	Defunciones ¹
	N	N (%)	N (%)	N (%)
<2	18105	439 (2,4)	17 (0,1)	10 (0,1)
2-4	26415	157 (0,6)	6 (0,0)	1 (0,0)
5-14	129657	500 (0,4)	27 (0,0)	2 (0,0)
15-29	295097	2762 (0,9)	137 (0,0)	25 (0,0)
30-39	205665	4408 (2,1)	283 (0,1)	46 (0,0)
40-49	240934	8299 (3,4)	700 (0,3)	171 (0,1)
50-59	205727	12342 (6,0)	1401 (0,7)	528 (0,3)
60-69	128051	14456 (11,3)	2078 (1,6)	1355 (1,1)
70-79	81466	16132 (19,8)	1854 (2,3)	3081 (3,8)
≥80	91559	25829 (28,2)	485 (0,5)	10853 (11,9)
Total	1432072	86000 (6,0)	7040 (0,5)	16278 (1,1)

¹ n (%) calculado sobre el total de casos en cada grupo de edad

Tabla 5. Características demográficas, clínicas y antecedentes epidemiológicos de riesgo. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE* con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Características	Total	Mujeres n (%)	Hombres n (%)	p-valor
Sexo		751585 (52,5)	679887 (47,5)	
Mediana de edad (rango)	41 (24-57)	42 (25-57)	40 (23-56)	<0,001
Grupo de edad (años)				
	<2	18105 (1,3)	8709 (1,2)	9394 (1,4)
	2-4	26415 (1,9)	13099 (1,8)	13312 (2,0)
	5-14	129657 (9,1)	63975 (8,6)	65644 (9,7)
	15-29	295097 (20,7)	151719 (20,3)	143336 (21,2)
	30-39	205665 (14,5)	109278 (14,6)	96362 (14,3)
	40-49	240934 (16,9)	126396 (16,9)	114505 (17,0)
	50-59	205727 (14,5)	107807 (14,4)	97890 (14,5)
	60-69	128051 (9,0)	64192 (8,6)	63826 (9,4)
	70-79	81466 (5,7)	42641 (5,7)	38794 (5,7)
	≥80	91559 (6,4)	59044 (7,9)	32482 (4,8)
Síntomas	703891 (54,5)	373472 (55,1)	330333 (53,8)	<0,001
Personal sanitario y sociosanitario	37318 (4,5)	29239 (6,7)	8071 (2,1)	<0,001
Personal sanitario que trabaja en*				
	Centro sanitario	22419 (60,1)	17060 (58,3)	5357 (66,4)
	Centro sociosanitario	10974 (29,4)	9367 (32,0)	1606 (19,9)
	Otros centros	3925 (10,5)	2812 (9,6)	1108 (13,7)
Número de contactos estrechos identificados*	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	<0,001
Ámbito de posible exposición*				
	Centro sociosanitario	37250 (4,1)	24800 (5,2)	12447 (2,9)
	Laboral	52639 (5,9)	26789 (5,6)	25794 (6,1)
	Centro sanitario	17951 (2,0)	10972 (2,3)	6978 (1,6)
	Domicilio	289551 (32,2)	154598 (32,6)	134934 (31,8)
	Escolar	15946 (1,8)	8174 (1,7)	7772 (1,8)
	Social^	790 (0,1)	445 (0,1)	345 (0,1)
	Otros	95949 (10,7)	48670 (10,3)	47272 (11,1)
	Desc	389262 (43,3)	200044 (42,2)	189186 (44,5)
Importado	4102 (0,4)	1586 (0,3)	2514 (0,5)	<0,001
Prueba de laboratorio*				
	Desconocida	217 (0,0)	113 (0,0)	101 (0,0)
	PCR/Técnicas moleculares	1274077 (89,0)	668960 (89,0)	604711 (88,9)
	Test rápido de anticuerpos	144 (0,0)	70 (0,0)	74 (0,0)
	Detección de antígeno	154904 (10,8)	80682 (10,7)	74031 (10,9)
	ELISA	2730 (0,2)	1760 (0,2)	970 (0,1)

*Se contabiliza solo una técnica diagnóstica por caso. Cuando a un individuo se le han realizado varias técnicas diagnósticas, se contabilizará solo aquella que sea considerada más específica y sensible, en este orden: 1º PCR y otras técnicas moleculares, 2º prueba rápida de detección de antígeno, 3º detección de anticuerpos por ELISA o equivalente, 4º prueba rápida de detección de anticuerpos

^La categoría de posible exposición "social" ha sido introducida a partir de la semana 46/2020, estando estos casos previamente englobados en "otros"

Tabla 6a. Principales indicadores: síntomas, tiempo entre eventos y contactos, por Comunidad Autónoma y total España, Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020

Comunidad Autónoma	Presencia de síntomas ¹	Tiempo entre eventos (días) ²					Casos sin contacto conocido con COVID ¹	Contactos identificados por caso ²
		Síntomas hasta consulta	Síntomas hasta diagnóstico	Síntomas hasta aislamiento	Consulta hasta diagnóstico	Consulta hasta aislamiento		
Andalucía	81628 (36,6)	2 (0-3)	3 (2-6)	0 (-2-2)	1(0-3)	0 (0-0)	30696 (24,7)	2 (1-4)
Aragón	44641 (65,9)	2 (0-4)	3 (2-5)	1 (0-2)	1(0-3)	0 (-3-0)	18405 (30,8)	2 (1-4)
Asturias	2454 (77,5)	1 (0-3)	3 (1-4)	1 (0-2)	1(1-2)	0 (-1-0)	1340 (21,4)	3 (1-6)
Baleares	16338 (71,8)	1 (0-3)	2 (1-4)	1 (1-1)	1(0-2)	0 (0-0)	10869 (47,7)	11 (11-11)
Canarias	12324 (66,7)	1 (0-3)	4 (2-6)	1 (0-3)	2(1-3)	0 (0-0)	2841 (18,4)	1 (0-3)
Cantabria	3808 (85,6)	1 (0-3)	3 (2-5)	1 (0-4)	1(0-3)	0 (-1-1)	4420 (49,1)	0 (0-2)
Castilla-La Mancha	40277 (58,0)	1 (0-3)	3 (2-6)	1 (0-3)	2(1-3)	0 (0-1)	23319 (33,6)	0 (0-2)
Castilla y León	47494 (56,1)	2 (0-4)	3 (1-5)	1 (0-3)	1(0-2)	0 (0-0)	18834 (25,8)	1 (0-3)
Cataluña	139207 (54,9)	3 (2-6)	2 (1-4)	1 (0-2)	-1(-2-0)	-2 (-4-0)	126238 (49,8)	3 (1-4)
C. Valenciana	59195 (63,0)	1 (0-4)	3 (2-6)	1 (0-3)	1(1-3)	0 (-1-0)	20570 (27,5)	3 (2-5)
Extremadura	11232 (47,2)	2 (1-4)	2 (1-4)	1 (0-2)	0(0-1)	0 (-2-0)	5358 (22,8)	2 (0-4)
Galicia	22930 (80,9)	2 (1-3)	3 (2-5)	1 (0-3)	0(0-1)	0 (-1-0)	20006 (47,9)	3 (1-5)
Madrid	146323 (51,6)	2 (0-4)	3 (1-5)	1 (0-3)	1(0-2)	0 (-2-1)	25407 (37,3)	3 (2-4)
Murcia	34486 (67,9)	1 (0-3)	3 (2-5)	0 (0-3)	1(1-3)	0 (-2-1)	13427 (26,6)	3 (2-5)
Navarra	22313 (64,5)	2 (1-4)	3 (2-5)	2 (1-4)	1(0-2)	0 (0-0)	11776 (34,1)	2 (1-4)
País Vasco	5774 (53,1)	1 (0-2)	3 (1-5)	1 (0-2)	1(0-2)	0 (0-0)	544 (8,6)	4 (1-5)
La Rioja	8172 (67,4)	2 (1-4)	3 (2-6)	1 (0-3)	0(0-2)	0 (-2-0)	1618 (14,9)	3 (1-4)
Ceuta	2346 (86,0)	3 (1-5)	4 (2-6)	2 (0-4)	1(0-2)	0 (-2-0)	1078 (39,5)	3 (2-5)
Melilla	2949 (73,8)	2 (1-5)	5 (2-8)	1 (0-3)	1(0-2)	0 (-4-0)	1685 (42,2)	2 (0-5)
Total España	703891 (54,5)	2 (1-4)	3 (1-5)	1 (0-3)	1 (0-2)	0 (-2-0)	338431 (35,6)	2 (1-4)

¹ n (%) calculado sobre el total de casos con información en esa variable. ² mediana (rango intercuartil).

Tabla 6b. Principales indicadores: síntomas, tiempo entre eventos y contactos, por Comunidad Autónoma y total España, Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico en las últimas 3 semanas epidemiológicas.

Comunidad Autónoma	Presencia de síntomas ¹	Tiempo entre eventos (días) ²					Casos sin contacto conocido con COVID ¹	Contactos identificados por caso ²
		Síntomas hasta consulta	Síntomas hasta diagnóstico	Síntomas hasta aislamiento	Consulta hasta diagnóstico	Consulta hasta aislamiento		
Andalucía	14127 (29,6)	2 (0-3)	2 (1-5)	0 (-3-1)	0(0-1)	0 (-1-0)	5867 (22,5)	1 (1-3)
Aragón	4570 (61,5)	1 (0-3)	2 (1-3)	0 (-1-2)	0(0-1)	0 (-2-0)	1638 (26,5)	2 (1-3)
Asturias	406 (96,2)	1 (0-2)	2 (1-3)	1 (0-1)	1(0-2)	0 (-1-1)	202 (9,6)	3 (1-4)
Baleares	3621 (79,5)	1 (-3-2)	1 (-3-3)	-	0(0-1)	-	1799 (39,5)	-
Canarias	1615 (72,1)	1 (0-3)	2 (1-4)	1 (0-2)	1(0-2)	0 (0-0)	372 (19,2)	1 (0-3)
Cantabria	490 (100,0)	2 (1-4)	3 (2-4)	1 (0-2)	0(0-2)	-1 (-3-0)	173 (31,9)	0 (0-0)
Castilla-La Mancha	5378 (55,7)	1 (0-2)	2 (1-4)	1 (0-2)	2(0-3)	0 (0-1)	2716 (28,1)	0 (0-2)
Castilla y León	6858 (56,8)	1 (0-3)	2 (1-3)	1 (0-2)	0(0-2)	0 (-1-0)	2460 (20,3)	2 (1-4)
Cataluña	16961 (52,7)	2 (1-3)	1 (0-3)	0 (0-2)	0(-2-0)	-1 (-3-0)	13919 (43,2)	3 (2-4)
C. Valenciana	10822 (53,5)	1 (0-3)	2 (1-4)	1 (0-2)	1(0-2)	0 (-1-0)	3230 (21,2)	3 (1-4)
Extremadura	2135 (52,8)	2 (1-3)	2 (1-3)	0 (0-2)	0(0-0)	-1 (-3-0)	782 (19,5)	1 (0-3)
Galicia	5716 (81,3)	2 (1-3)	3 (2-4)	1 (0-3)	1(0-1)	0 (-1-0)	3242 (34,6)	2 (1-4)
Madrid	16833 (72,4)	1 (0-3)	2 (1-3)	1 (0-2)	1(0-1)	0 (-1-1)	3730 (31,2)	3 (2-4)
Murcia	3909 (56,4)	1 (0-2)	2 (1-4)	0 (0-2)	1(0-2)	0 (-1-1)	1673 (24,0)	3 (2-4)
Navarra	1855 (62,7)	2 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)	0(0-0)	0 (0-0)	717 (24,2)	2 (1-4)
País Vasco	268 (29,6)	1 (0-2)	1 (0-3)	0 (-1-2)	1(0-6)	0 (-1-0)	9 (1,5)	-
La Rioja	1291 (67,0)	1 (0-3)	3 (2-4)	1 (0-2)	1(0-2)	0 (-1-0)	298 (18,6)	3 (1-4)
Ceuta	312 (75,5)	2 (1-3)	2 (1-4)	1 (0-2)	0(0-0)	0 (-1-0)	153 (37,0)	4 (2-6)
Melilla	318 (66,1)	2 (1-4)	2 (1-6)	1 (0-2)	0(0-1)	0 (-4-0)	220 (45,7)	2 (0-4)
Total España	97485 (52,7)	1 (0-3)	2 (1-4)	1 (0-2)	0 (0-1)	0 (-2-0)	43200 (29,0)	2 (1-4)

¹ n (%) calculado sobre el total de casos con información en esa variable. ² mediana (rango intercuartil). Sobre los casos notificados las últimas 3 semanas epidemiológicas (semanas 46, 47 y 48).

Figura 2. Distribución por edad y sexo, Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020 y población española






Figura 3. Curva epidémica de casos de COVID-19 según gravedad, Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020



Los casos diarios están representados con la fecha de inicio de síntomas y en su ausencia la de diagnóstico menos tres días; en los casos asintomáticos se utiliza la fecha de diagnóstico. Los casos hospitalizados están representados por fecha de hospitalización, los casos UCI por fecha de admisión en UCI y las defunciones por fecha de defunción. Fuente: CNE. RENAVE. Los datos de la última semana podrían estar afectados por retraso en la notificación, por lo que la evolución de los últimos días debe ser interpretada con cautela.

Figura 4. Distribución del número de casos por grupos de edad y situación clínica, Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020



Fuente: CNE. ISCIII. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Figura 5. Porcentaje de casos según presencia de síntomas, por Comunidad Autónoma y total España. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020




Figura 6a. Distribución porcentual de casos por CCAA y técnica diagnóstica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020




Figura 6b. Distribución porcentual de casos por CCAA y técnica diagnóstica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con fecha de diagnóstico a partir del 25 de septiembre.




Figura 7. Distribución porcentual de profesionales sanitarios por CCAA. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020




Figura 8. Distribución porcentual por centro de ocupación de los casos en personal sanitario y por CCAA. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020






Figura 9. Distribución porcentual de casos por CCAA y ámbito de exposición. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020



^La categoría de posible exposición "social" ha sido introducida a partir de la semana 46/2020, estando estos casos previamente englobados en "otros"


Comparación de los indicadores de gravedad entre los casos notificados antes y después de la entrada en vigor de la nueva Estrategia de Vigilancia y Control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19 (11 de mayo de 2020)

Hospitalizaciones




- a Porcentaje de hospitalizados a partir del 11 de mayo calculado sobre todos los casos diagnosticados a partir del 11 de mayo
- b Porcentaje de hospitalizados a partir del 11 de mayo calculado solo sobre los casos con síntomas a partir del 11 de mayo

Ingreso en UCI entre los casos hospitalizados



Defunción entre los casos hospitalizados



Observaciones

- En el análisis de los casos notificados a la RENAVE con fecha de diagnóstico posterior al 10 de mayo, y hasta las 16:45 h del 2 de diciembre de 2020, se identifican 1.432.027 casos de COVID-19 en España. Un 6% de los casos han sido hospitalizados, un 0,5% han sido admitidos en UCI y un 1,1% han fallecido.
- La mayor proporción de casos de COVID-19 se producen en el grupo de 15 a 59 años (67% del total), siendo el grupo de 15-29 años el más representado, con un 21% de los casos.
- El porcentaje de hospitalizaciones y defunciones con COVID-19 aumenta con la edad, alcanzando un 28,2% y 11,9% en mayores de 79 años, respectivamente.
- A nivel nacional, la incidencia semanal acumulada de COVID-19 disminuye un 29% entre la semana 46 (9 - 15 de noviembre) y la semana 47 (16 - 22 de noviembre), siendo este descenso significativo en todos los grupos de edad.
- Por CCAA, en la semana 46, se observan tasas acumuladas semanales > 300 casos/100.000 h en Asturias, Castilla y León y País Vasco. En la semana 47 todas las CCAA se encuentran por debajo de 300 casos/100.000 h. Asturias, Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Melilla se encuentran por encima de 200 casos/100.000 h en dicha semana. En relación a la tendencia, entre las semanas 46 y 47 se observa un descenso significativo de la incidencia acumulada en prácticamente todas las CCAA.
- El 52,5% de los casos de COVID-19 son mujeres y la mediana de edad de los casos es de 41 años, siendo mayor en mujeres que en hombres (42 vs 40 años).
- Con respecto a la distribución por sexo y edad de la población española, los casos de COVID-19, están sobrerrepresentados en los hombres de 15-39 años, en mujeres de 15-49 años y en mayores de 89 años para ambos sexos, especialmente en mujeres.
- El 54,5% de los casos presentó síntomas.
- El 89,0% de los diagnósticos se realizaron con técnicas de PCR, y un 10,8% por técnicas rápidas de detección de antígeno, con diferencias entre las distintas CCAA.
- Un 35,6% no refería contacto conocido con un caso diagnosticado de COVID-19, porcentaje que se reduce al 29% al restringir el análisis a las últimas tres semanas epidemiológicas.
- El ámbito más frecuente de exposición se da en el entorno del domicilio (32,2%).
- Un 4,5% de los casos son personal sanitario o sociosanitario, siendo significativamente mayor este porcentaje entre las mujeres que entre los hombres (6,7% vs 2,1%). El 78% del personal sanitario o sociosanitario con COVID-19, notificado desde el 11 de mayo, son mujeres.
- El porcentaje de casos importados es de 0,4%.
- En el análisis del tiempo transcurrido entre los distintos eventos, se observa que la mediana de tiempo entre el inicio de síntomas y el primer contacto con el sistema sanitario es de 2 días (RIC: 1-4 días), hasta el diagnóstico es de 3 (RIC: 1-5) y hasta el aislamiento de 1 días (RIC: 0-3). A nivel nacional estos valores no cambian al restringir el análisis a las últimas tres semanas epidemiológicas.
- Desde el 11 de mayo se estima una mediana de 2 contactos (RIC: 1-4) identificados por caso, sin cambios al analizar los datos de las últimas tres semanas epidemiológicas.
- En la comparación de los indicadores de gravedad entre los casos notificados antes y después del 11 de marzo, se observa que:
 - El porcentaje de hospitalización aumenta con la edad en ambos periodos, pero es menor en todos los grupos de edad después del 11 de mayo, en consonancia con una mayor

capacidad diagnóstica en el segundo periodo, de forma que el porcentaje de casos con criterio de ingreso es menor. El porcentaje de hospitalización a partir del 11 de mayo es mayor cuando en el análisis se tiene en cuenta sólo los casos sintomáticos que cuando se analiza el total de casos. La distribución por grupos de edad es similar en ambos períodos, excepto en el grupo de menores de 15 años, probablemente porque en el primer período se realizó test diagnóstico mayoritariamente a los casos más graves, mientras que en el segundo se ha realizado a gran número de niños sin criterios de gravedad. Los mayores de 80 años presentan el porcentaje de ingreso más alto, en relación al resto de grupos de edad, en el segundo período pero no en el primero.

- El porcentaje y distribución por grupo de edad de los casos ingresados en UCI entre los hospitalizados es similar en ambos periodos, aunque ligeramente inferiores en el segundo.
- La distribución del porcentaje de defunciones entre los casos hospitalizados es similar en ambos períodos, si bien los porcentajes son inferiores en todos los grupos de edad en el segundo periodo. Esto, junto lo observado en el caso de ingreso en UCI, podría indicar una mayor capacidad de ingreso en el segundo período, aceptando para su ingreso pacientes menos graves de entrada.

Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas, MoMo

MoMo es un sistema de vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas que proporciona información sobre el impacto en la mortalidad de la población de todo evento que pueda suponer una amenaza para la Salud Pública, Sus resultados pueden apoyar las evaluaciones de riesgo de dichos eventos y contribuir a guiar adecuadamente la respuesta de salud pública y el desarrollo de políticas de control,

Mediante el sistema MoMo, el Centro Nacional de Epidemiología estima los excesos de mortalidad por todas las causas por sexo y grupos de edad y a nivel nacional y por CCAA, Los resultados son estimaciones de exceso de defunciones por todas las causas, es decir, son excesos de defunciones de carácter inespecífico que no se pueden atribuir directamente a una causa determinada,

Por otra parte, en el momento actual observamos un retraso en la notificación de defunciones en los registros civiles de varias CCAA, por lo que los resultados deben interpretarse con precaución, especialmente en los últimos días y siempre deben ser confirmados con el análisis de los próximos días,

Las estimaciones de MoMo pueden consultarse aquí: [Informes MoMo 2020](#)