

Informe sobre la situación de COVID-19 en España

Informe COVID-19 nº 28. 04 de mayo de 2020



Contenido

Introducción	3
Casos notificados de COVID-19 en España	4
Características demográficas, clínicas y epidemiológicas	6
Características clínicas y gravedad	8
Principales resultados	13
Nota metodológica	14
Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo	15

Introducción

En diciembre de 2019 surgió un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei, China), con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo virus de la familia *Coronaviridae* que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2¹. La secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. La enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso internacional COVID-19. El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020. Posteriormente, la OMS lo reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020.

En España, las comunidades autónomas (CCAA) notifican diariamente al Ministerio de Sanidad las cifras de casos confirmados acumulados de COVID-19: total de casos, casos en profesionales sanitarios, hospitalizaciones, ingresos en UCI, fallecidos y casos recuperados.

Al mismo tiempo, las CCAA completan, según acceden a la información, la encuesta individualizada para cada uno de dichos casos. La encuesta incluye información clínico-epidemiológica consensuada y aprobada por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), y la notifican mediante la plataforma informática SIVIES (Sistema para la Vigilancia en España), que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología.

¹ <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>

Este informe contiene información de los casos de COVID-19 notificados al Centro Nacional de Epidemiología a través de la plataforma SiViES hasta la extracción de datos (12:00 h del 04 de mayo de 2020): 211.077 casos que suponen el 97% de los 218.011 casos confirmados por PCR en España cuantificados hasta el día 03 de mayo de 2020 (21:00 h). Su objetivo es obtener una información detallada sobre las características clínicas y epidemiológicas de los casos de COVID-19 y los factores que pueden estar asociados a una mayor gravedad. Los resultados deben confirmarse con posteriores actualizaciones de COVID-19 en SiViES.

Casos notificados de COVID-19 en España

Tabla 1. Distribución por CCAA. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

CCAA	Casos notificados a la RENAVE ¹	% ²
Andalucía	14147	100
Aragón	4688	90
Asturias	2690	100
Baleares	1996	100
Canarias	2251	100
Cantabria	2530	100
Castilla-La Mancha	16779	100
Castilla y León	15852	91
Cataluña	41573	83
C. Valenciana	12433	100
Extremadura	4458	100
Galicia	9499	100
Madrid	61577	99
Murcia	1745	100
Navarra	4080	83
País Vasco	10683	82
La Rioja	3820	96
Ceuta	152	100
Melilla	124	100
Total	211077	97

¹Extracción de datos de SiViES confirmados por cualquier técnica a las 12:00 h del 04-05-2020.

²Porcentaje de casos de COVID-19 notificados a la RENAVE respecto a la notificación agregada de casos confirmados por PCR a CCAES hasta las 21:00 h del 03-05-2020

Figura 1. Curva epidémica por fecha de inicio de síntomas¹ y fecha de diagnóstico¹ Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE





Figura 2. Curva epidémica de casos de COVID-19 según gravedad. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE



Características demográficas, clínicas y epidemiológicas

Tabla 2. Características demográficas, clínicas y antecedentes epidemiológicos de riesgo. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE¹ (N=211.077)

Características	n*	Total N (%)	Mujeres N (%)	Hombres N (%)	p-valor
Sexo	210881		117830 (55,8)	93051 (44,1)	
Edad. Mediana (RIC) ²	210124	60 (46-78)	59 (44-80)	62 (48-77)	<0,001
Grupo de edad (años)					
<2		320 (0,2)	137 (0,1)	183 (0,2)	
2-4		149 (0,1)	71 (0,1)	78 (0,1)	
5-14		581 (0,3)	273 (0,2)	308 (0,3)	
15-29		12518 (6,0)	8290 (7,1)	4228 (4,6)	
30-39		19710 (9,4)	12364 (10,5)	7346 (7,9)	
40-49		30571 (14,5)	17822 (15,2)	12748 (13,7)	
50-59		37478 (17,8)	21102 (18,0)	16375 (17,6)	
60-69		30997 (14,8)	14668 (12,5)	16329 (17,6)	
70-79		29890 (14,2)	13188 (11,2)	16702 (18,0)	
≥80		47910 (22,8)	29399 (25,1)	18509 (19,9)	<0,001
Síntomas ¹					
Fiebre o reciente historia de fiebre	66608	49640 (74,5)	24252 (69,5)	25388 (80,1)	<0,001
Tos	60491	44361 (73,3)	23028 (72,7)	21332 (74,1)	<0,001
Dolor de garganta	18495	4694 (25,4)	2914 (28,7)	1779 (21,4)	<0,001
Disnea	62184	32572 (52,4)	15816 (48,9)	16755 (56,2)	<0,001
Escalofríos	18219	5773 (31,7)	3097 (31,1)	2675 (32,4)	0,045
Vómitos	18496	1808 (9,8)	1129 (11,2)	679 (8,1)	<0,001
Diarrea	19323	5718 (29,6)	3268 (31,0)	2450 (27,9)	<0,001
Neumonía (radiológica o clínica)	102547	56367 (55,0)	24413 (45,9)	31952 (64,8)	<0,001
Síndrome de distrés respiratorio agudo	69441	4704 (6,8)	1763 (4,7)	2941 (9,2)	<0,001
Otros síntomas resp.	59576	8336 (14,0)	3741 (11,7)	4595 (16,6)	<0,001
Fallo renal agudo	69880	3614 (5,2)	1349 (3,6)	2265 (7,1)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo ¹					
Una o más	129937	85139 (65,5)	43589 (62,2)	41547 (69,4)	<0,001
Enfermedad cardiovascular	118490	35192 (29,7)	16065 (25,2)	19125 (35,0)	<0,001
Enfermedad respiratoria	118490	12363 (10,4)	5094 (8,0)	7268 (13,3)	<0,001
Diabetes	118490	19077 (16,1)	8519 (13,3)	10558 (19,3)	<0,001
Hipertensión arterial [†]	118490	23377 (19,7)	12358 (19,4)	11019 (20,2)	<0,001
Hospitalización	182568	83981 (46,0)	36640 (36,3)	47265 (58,1)	<0,001
Ventilación mecánica	58737	4277 (7,3)	1302 (4,3)	2975 (10,5)	<0,001
Admisión UCI ³	122329	6883 (5,6)	2093 (3,2)	4785 (8,4)	<0,001
Defunción	211077	16575 (7,9)	6934 (5,9)	9641 (10,4)	<0,001
Contacto estrecho con casos COVID-19 probable o confirmado	11672	6078 (52,1)	3808 (58,9)	2270 (43,6)	<0,001
Contacto con persona con infección respiratoria aguda	13592	6958 (51,2)	4382 (56,5)	2576 (44,1)	<0,001
Profesional sanitario	142032	30660 (21,6)	23178 (29,2)	7482 (11,9)	<0,001
Visita a centro sanitario	7922	1113 (14,0)	666 (16,0)	447 (11,9)	<0,001


¹Los porcentajes se calculan sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información de cada variable. ²RIC: rango intercuartil. ³UCI: Unidad de cuidados intensivos. *n: número de casos con información sobre la variable. †La información sobre hipertensión arterial se recoge a partir del 18-03-2020. Datos actualizados a 04-05-2020.

Tabla 3. Días transcurridos entre el inicio de síntomas y diferentes eventos. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

	n*	Total Mediana (RIC) ¹	Mujeres Mediana (RIC) ¹	Hombres Mediana (RIC) ¹	p-valor
Hasta diagnóstico (días)	134200	6 (2-10)	5 (2-10)	6 (3-10)	0,097
Hasta notificación CCAA (días)	146376	6 (2-10)	6 (2-10)	6 (3-10)	<0,001
Hasta hospitalización (días)	70769	6 (3- 9)	6 (3- 9)	6 (3- 9)	0,735
Hasta ingreso en UCI (días)	3727	8 (6-11)	8 (5-11)	8 (6-11)	0,455
Hasta defunción (días)	13242	11 (7-16)	10 (6-15)	11 (7-17)	<0,001

¹RIC: rango intercuartil. *n: número de casos con información sobre la variable. Datos actualizados a 04-05-2020.

Figura 3. Distribución por edad y sexo. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE y población española



Fuente: CNE. ISCIII. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Datos actualizados a 04-05-2020.

Características clínicas y gravedad

Figura 4. Distribución del número de casos por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE




Figura 5. Distribución porcentual de casos y defunciones por grupo de edad. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE




Tabla 4.1. Número de casos por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE, total

Grupo de edad (años)	Casos totales N	Hospitalizados n (%) ¹	UCI n (%) ¹	Defunciones n (%) ¹
<2	320	161 (56,5)	25 (11,7)	2 (0,6)
2-4	149	39 (31,7)	4 (5,5)	0 (0,0)
5-14	581	126 (24,5)	18 (5,3)	0 (0,0)
15-29	12518	1485 (14,1)	91 (1,4)	26 (0,2)
30-39	19710	3479 (20,7)	231 (2,1)	55 (0,3)
40-49	30571	8042 (30,5)	661 (3,8)	182 (0,6)
50-59	37478	13021 (40,2)	1360 (6,1)	551 (1,5)
60-69	30997	16095 (59,1)	2191 (11,2)	1481 (4,8)
70-79	29890	19289 (72,9)	1969 (10,4)	4144 (13,9)
≥80	47910	22132 (53,9)	326 (1,3)	10124 (21,1)
Total	211077	83981 (46,0)	6883 (5,6)	16575 (7,9)

¹Los porcentajes se calculan sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información de cada variable. Datos actualizados a 04-05-2020.

Tabla 4.2. Número de casos por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE, mujeres

Grupo de edad (años)	Casos totales N	Hospitalizados n (%) ¹	UCI n (%) ¹	Defunciones n (%) ¹
<2	137	64 (54,2)	8 (10,0)	1 (0,7)
2-4	71	23 (37,7)	3 (7,7)	0 (0,0)
5-14	273	57 (24,3)	4 (2,9)	0 (0,0)
15-29	8290	783 (11,3)	38 (0,9)	10 (0,1)
30-39	12364	1671 (15,9)	84 (1,2)	21 (0,2)
40-49	17822	3310 (21,6)	198 (2,0)	69 (0,4)
50-59	21102	5322 (29,4)	390 (3,2)	156 (0,7)
60-69	14668	6374 (49,6)	611 (6,8)	431 (2,9)
70-79	13188	7779 (66,8)	603 (7,4)	1312 (9,9)
≥80	29399	11239 (45,1)	154 (1,1)	4927 (16,8)
Total	117830	36640 (36,3)	2093 (3,2)	6934 (5,9)

¹Los porcentajes se calculan sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información de cada variable. Datos actualizados a 04-05-2020.

Tabla 4.3. Número de casos por grupos de edad y situación clínica. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE, hombres

Grupo de edad (años)	Casos totales N	Hospitalizados n (%) ¹	UCI n (%) ¹	Defunciones n (%) ¹
<2	183	97 (58,1)	17 (12,8)	1 (0,5)
2-4	78	16 (25,8)	1 (2,9)	0 (0,0)
5-14	308	69 (24,7)	14 (7,1)	0 (0,0)
15-29	4228	702 (19,5)	53 (2,3)	16 (0,4)
30-39	7346	1808 (28,6)	147 (3,5)	34 (0,5)
40-49	12748	4731 (42,8)	463 (6,1)	113 (0,9)
50-59	16375	7699 (53,9)	970 (9,7)	395 (2,4)
60-69	16329	9721 (67,4)	1580 (15,0)	1050 (6,4)
70-79	16702	11510 (77,7)	1366 (12,6)	2832 (17,0)
≥80	18509	10891 (67,5)	172 (1,6)	5197 (28,1)
Total	93051	47265 (58,1)	4785 (8,4)	9641 (10,4)

¹Los porcentajes se calculan sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información de cada variable. Datos actualizados a 04-05-2020.

Tabla 5. Características de los casos según presencia de neumonía¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹	Con neumonía n (%)	Sin neumonía n (%)	p-valor
Total	56367 (55)	46180 (45)	
Sexo			
Mujeres	24413 (43)	28801 (62)	
Hombres	31952 (57)	17379 (38)	<0,001
Edad, mediana (RIC) ²	67 (54-79)	53 (40-69)	<0,001
Grupo de edad (años)			
<2	24 (0)	146 (0)	
2-4	17 (0)	59 (0)	
5-14	54 (0)	205 (0)	
15-29	1041 (2)	4210 (9)	
30-39	2668 (5)	6277 (14)	
40-49	6248 (11)	8497 (18)	
50-59	9786 (17)	9272 (20)	
60-69	11013 (20)	5885 (13)	
70-79	12465 (22)	4260 (9)	
≥80	13039 (23)	7154 (16)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo (una o más)	39028 (76)	22644 (55)	<0,001
Enfermedad cardiovascular (sí)	18993 (39)	7817 (21)	<0,001
Enfermedad respiratoria (sí)	6268 (13)	2887 (8)	<0,001
Diabetes (sí)	10305 (21)	3810 (10)	<0,001
Otra (sí)	26872 (48)	13806 (30)	<0,001
Hospitalización (sí)	51074 (91)	10084 (23)	<0,001
Ventilación mecánica (sí)	3325 (11)	268 (1)	<0,001
Admisión UCI (sí)	4876 (10)	533 (2)	<0,001
Defunción (sí)	9509 (17)	1945 (4)	<0,001

¹Análisis sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre la presencia o ausencia de neumonía. ²RIC: rango intercuartílico. Datos actualizados a 04-05-2020.

Tabla 6. Características según hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹	Hospitalizados UCI n (%)	Hospitalizados no UCI n (%)	p-valor
Total	6795 (11)	57554 (89)	
Sexo			
Mujer	2037 (30)	25776 (45)	
Hombre	4753 (70)	31707 (55)	<0,001
Edad, mediana (RIC) ²	65 (56-72)	70 (55-81)	<0,001
Grupo de edad (años)			
<2	23 (0)	109 (0)	
2-4	4 (0)	28 (0)	
5-14	18 (0)	82 (0)	
15-29	83 (1)	1096 (2)	
30-39	223 (3)	2551 (4)	
40-49	638 (9)	5530 (10)	
50-59	1341 (20)	8826 (15)	
60-69	2179 (32)	10292 (18)	
70-79	1962 (29)	12874 (22)	
≥80	317 (5)	16080 (28)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo (una o más)	4591 (81)	39321 (79)	<0,001
Enfermedad cardiovascular (sí)	2267 (44)	20397 (42)	0,030
Enfermedad respiratoria (sí)	744 (14)	6879 (14)	0,796
Diabetes (sí)	1315 (25)	10899 (23)	<0,001
Otra (sí)	2600 (38)	27930 (49)	<0,001
Neumonía (radiológica o clínica) (sí)	4865 (91)	39434 (84)	<0,001
Síndrome de distrés respiratorio agudo (sí)	1689 (48)	2278 (8)	<0,001
Defunción (sí)	1853 (27)	9520 (17)	<0,001

¹Análisis sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre el ingreso en UCI. ²RIC: rango intercuartílico. Datos actualizados a 04-05-2020.

Tabla 7. Características según defunción¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹	Defunción n (%)	No defunción n (%)	p-valor
Total	16575 (8)	194502 (92)	
Sexo			
Mujeres	6934 (42)	110896 (57)	
Hombres	9641 (58)	83410 (43)	<0,001
Edad, mediana (RIC) ²	83 (75-88)	59 (45-75)	<0,001
Grupo de edad (años)			
<2	2 (0)	318 (0)	
2-4	0 (0)	149 (0)	
5-14	0 (0)	581 (0)	
15-29	26 (0)	12492 (6)	
30-39	55 (0)	19655 (10)	
40-49	182 (1)	30389 (16)	
50-59	551 (3)	36927 (19)	
60-69	1481 (9)	29516 (15)	
70-79	4144 (25)	25746 (13)	
≥80	10124 (61)	37786 (20)	<0,001
Profesional sanitario (sí)	35 (0)	30625 (24)	<0,001
Hospitalización (sí)	14079 (87)	69902 (42)	<0,001
Admisión UCI (sí)	1855 (15)	5028 (5)	<0,001
Enfermedades y factores de riesgo (una o más)	13448 (95)	71691 (62)	<0,001
Enfermedad cardiovascular (sí)	7823 (62)	27369 (26)	<0,001
Enfermedad respiratoria (sí)	2561 (20)	9802 (9)	<0,001
Diabetes (sí)	4133 (33)	14944 (14)	<0,001
Otra (sí)	8738 (53)	45371 (23)	<0,001
Neumonía (radiológica o clínica) (sí)	9509 (83)	46858 (51)	<0,001
Síndrome de distrés respiratorio agudo (sí)	1780 (27)	2924 (5)	<0,001
Ventilación mecánica (sí)	1362 (19)	2915 (6)	<0,001


¹Porcentaje sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre las variables señaladas. ²Rango Intercuartílico. Datos actualizados a 04-05-2020.

Tabla 8. Características según nivel de gravedad¹. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE

Características ¹	No hospitalizados n (%)	Hospitalizados n (%)	UCI n (%)	Defunción n (%)
Total	98587 (54,0)	83981 (46,0)	6883 (5,6)	16575 (7,9)
Sexo				
Mujer	64424 (65,3)	36640 (43,6)	2093 (30,4)	6934 (41,8)
Hombre	34044 (34,5)	47265 (56,3)	4785 (69,5)	9641 (58,2)
Edad, mediana (RIC) ²	53 (56-80)	69 (40-72)	64 (40-72)	83 (75-88)
Grupo de edad (años)				
<2	124 (0,1)	161 (0,2)	25 (0,4)	2 (0,0)
2-4	84 (0,1)	39 (0,0)	4 (0,1)	0 (0,0)
5-14	388 (0,4)	126 (0,2)	18 (0,3)	0 (0,0)
15-29	9048 (9,2)	1485 (1,8)	91 (1,3)	26 (0,2)
30-39	13325 (13,6)	3479 (4,1)	231 (3,4)	55 (0,3)
40-49	18326 (18,7)	8042 (9,6)	661 (9,6)	182 (1,1)
50-59	19372 (19,8)	13021 (15,5)	1360 (19,8)	551 (3,3)
60-69	11158 (11,4)	16095 (19,2)	2191 (31,9)	1481 (8,9)
70-79	7155 (7,3)	19289 (23,0)	1969 (28,6)	4144 (25,0)
≥80	18928 (19,3)	22132 (26,4)	326 (4,7)	10124 (61,1)
Enfermedades y factores de riesgo (una o más)	28794 (49,3)	53338 (79,0)	4615 (80,7)	13448 (95,4)
Enfermedad cardiovascular (sí)	8845 (16,4)	25944 (41,4)	2272 (43,4)	7823 (61,9)
Enfermedad respiratoria (sí)	3286 (6,1)	8933 (14,3)	747 (14,3)	2561 (20,3)
Diabetes (sí)	4644 (8,6)	14206 (22,7)	1317 (25,1)	4133 (32,7)
Otra (sí)	7396 (13,7)	15576 (24,9)	881 (16,8)	4231 (33,5)
Neumonía (radiológica o clínica) (sí)	5149 (13,3)	51074 (83,5)	4876 (90,1)	9509 (83,0)
Ventilación mecánica (sí)	0 (0,0)	4267 (11,8)	3303 (78,0)	1362 (18,7)

¹Análisis sobre los casos de COVID-19 de los que se dispone de información sobre la gravedad. ²RIC: rango intercuartílico. Las categorías no son excluyentes, un mismo caso puede estar representado en más de una columna. Datos actualizados a 04-05-2020.

Figura 6. Distribución por sexo y edad según el nivel de gravedad. Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE



Principales resultados

- Desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2 se han notificado 218.011 casos de COVID-19 en España diagnosticados por PCR. Hasta las 12:00 h del 04 de abril de 2020 se ha recibido información en SiViES de 211.077 casos confirmados por cualquier técnica, lo que supondría un 97%.
- El 55,8% de los casos de COVID-19 son mujeres y la mediana de edad de los casos es 60 años, siendo mayor en hombres que en mujeres (62 vs 59 años). Los síntomas más frecuentes que se refieren son fiebre, tos, disnea y escalofríos; un 40% presentó clínica digestiva (diarrea o vómitos). Los hombres presentan una mayor prevalencia de fiebre y disnea, mientras que el dolor de garganta y la clínica digestiva son significativamente más frecuentes en mujeres. Un 46% de los casos notificados a SiViES han sido hospitalizados, 55% han desarrollado neumonía, un 5,6% han sido admitidos en UCI y un 7,9% han fallecido. Los hombres presentan una mayor prevalencia de neumonía, enfermedades de base (cardiovascular, respiratoria, diabetes, hipertensión) y un mayor porcentaje de hospitalización, admisión en UCI, ventilación mecánica y letalidad que las mujeres. Se estima que un 7,3% de pacientes necesitan ventilación mecánica, 10,5% en hombres y 4,3% en mujeres.
- La distribución por sexo y grupo de edad indica que los casos de COVID-19, con respecto a la distribución de la población española, están sobrerrepresentados entre los mayores de 50 años, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres llama la atención de forma más acusada entre los 45 y 65 años, y en los hombres a partir de los 60 años. Por el contrario, la presentación de casos de COVID-19 en menores de 25 años de ambos sexos es muy baja.
- Un 21,6% de los casos notificados a SiViES son personal sanitario (dato calculado sobre los casos que tenían información sobre esta variable), siendo significativamente mayor este porcentaje entre las mujeres que entre los hombres (29,1 vs 11,7%). El 75% del personal sanitario con COVID-19 son mujeres.
- En un análisis específico sobre neumonía se observa que los pacientes con neumonía son significativamente mayores que los que no presentan neumonía (67 vs 54 años, respectivamente). Los hombres, las personas mayores de 60 años y las que presentan enfermedad de base (especialmente enfermedad cardiovascular y diabetes) están más representados entre los pacientes que presentan neumonía. Como es de esperar, los porcentajes de hospitalización, ventilación mecánica, admisión en UCI y defunción son significativamente mayores en los casos con neumonía.
- Los pacientes ingresados en UCI son significativamente más jóvenes que los hospitalizados sin ingreso en UCI (edad mediana 65 vs 70 años), siendo el porcentaje de pacientes mayores de 80 años con ingreso en UCI del 5% frente al 28% en el grupo de hospitalizados sin ingreso en UCI. Entre los ingresados en UCI, frente a los hospitalizados sin ingreso en UCI, están más representados los hombres y existe una mayor prevalencia de enfermedades de base, neumonía y otras complicaciones respiratorias.
- En un análisis específico sobre defunción se observa que los pacientes fallecidos, frente a los no fallecidos, son significativamente mayores (edad mediana 83 vs 59 años), los hombres están más representados, presentan más frecuentemente enfermedades de base, neumonía y otras complicaciones respiratorias, y han sido hospitalizados e ingresados en UCI con mayor frecuencia. El 86% de los pacientes que fallecen tienen más de 70 años, el 95% de los mismos presentaban algún tipo de enfermedad de base previa y el 62% padecían una enfermedad cardiovascular.
- En una escala de gravedad de 1) casos no hospitalizados, 2) casos hospitalizados, 3) casos admitidos en UCI y 4) fallecidos, se observa que el porcentaje de pacientes mayores de 70 años aumenta de 27% en pacientes no hospitalizados a 86% en pacientes fallecidos. A medida que aumenta la gravedad se observa también un mayor porcentaje de hombres y de pacientes con enfermedad de base. La prevalencia de enfermedad de base es de 49% en los casos no hospitalizados, 79% en los casos hospitalizados, 81% en los ingresados en UCI y 95% en los fallecidos. En definitiva, los hombres, los pacientes de mayor edad y con enfermedades de base y factores de riesgo están más representados a

medida que aumenta la gravedad. La enfermedad cardiovascular es la que presenta mayor prevalencia entre los pacientes de COVID-19 hospitalizados (41%), en UCI (43%) y fallecidos (62%).

- En la pirámides de distribución de casos por sexo y edad en función de la gravedad se observa un predominio de mujeres en los casos no hospitalizados y de hombres en los que requieren hospitalización. El número de casos hospitalizados y no hospitalizados, por debajo de los 25 años, es bajo en ambos sexos. La mayoría de casos hospitalizados sin ingreso en UCI ni defunción, así como los casos con ingreso en UCI o defunción, se dan entre hombres, superando ampliamente a la proporción de mujeres a partir de los 45 años, y de forma más acusada a partir de los 70 años.

Nota metodológica

Desde el principio de la pandemia de COVID-19, la vigilancia de los casos de esta enfermedad en España se basa en la notificación universal de todos los casos confirmados de COVID-19 que se identifican en cada CCAA. Las CCAA notifican al nivel central esta información de dos formas diferentes:

- Una notificación diaria del número de casos agregados de COVID-19 por CCAA al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del Ministerio de Sanidad. Los datos contienen información sobre casos totales, casos en profesionales sanitarios, hospitalizados, admisiones en UCI, fallecidos y recuperados.
- Una notificación individualizada de casos de COVID-19 a la RENAVE a través de la plataforma informática vía Web SiViES que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología (CNE). Esta información procede de la encuesta epidemiológica de caso que cada CA cumplimenta ante la identificación de un caso de COVID-19 y contiene datos demográficos, epidemiológicos y clínicos de los casos de COVID-19 identificados en España. Para conseguir una información completa de cada caso, la CA debe realizar sucesivas actualizaciones de la información de la encuesta porque no siempre toda la información está disponible desde la identificación del caso, o precisa de una actualización según cambia la evolución clínica del paciente. Las actualizaciones de la información de los casos las realizan las CCAA, según disponen de ellas, en la plataforma SiViES mediante un determinado soporte electrónico. Para ello, las CCAA reciben el apoyo permanente del equipo SiViES del CNE. Sin embargo, la situación de intensísima carga de trabajo en todas la Unidades de Salud Pública de las CCAA implica un esfuerzo muy importante para lograr la notificación individualizada a la RENAVE, especialmente, su actualización para completar la información de la encuesta epidemiológica de caso.

Mientras que la notificación agregada se acerca más a la realidad de la evolución de la pandemia de COVID-19 en España, la información de la RENAVE es todavía incompleta, si bien puede ofrecer una información más precisa sobre las características epidemiológicas y clínicas o los factores de riesgo y enfermedades de base que podrían estar asociados a los casos de COVID-19 identificados en España.

Los datos agregados de COVID-19 se pueden consultar en: <https://covid19.isciii.es/>

La información individualizada debe ser consolidada con sucesivas actualizaciones para evitar interpretaciones erróneas durante su análisis.

Es importante resaltar que todos los resultados son provisionales y deben interpretarse con precaución, porque se ofrece información de cada variable con la información disponible para cada una de ellas. En el caso de “defunción”, hemos considerado como “no defunción” los casos sin información en esta variable, y deben ser confirmados en posteriores análisis.

Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo

MoMo es un sistema de vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas que proporciona información sobre el impacto en la mortalidad de la población de todo evento que pueda suponer una amenaza para la Salud Pública. Sus resultados pueden apoyar las evaluaciones de riesgo de dichos eventos y contribuir a guiar adecuadamente la respuesta de salud pública y el desarrollo de políticas de control.

Mediante el sistema MoMo, el Centro Nacional de Epidemiología estima los excesos de mortalidad por todas las causas por sexo y grupos de edad y a nivel nacional y por CCAA. Los resultados son estimaciones de exceso de defunciones por todas las causas, es decir, son excesos de defunciones de carácter inespecífico que no se pueden atribuir directamente a una causa determinada.

Por otra parte, en el momento actual observamos un retraso en la notificación de defunciones en los registros civiles de varias CCAA, por lo que los resultados deben interpretarse con precaución, especialmente en los últimos días y siempre deben ser confirmados con el análisis de los próximos días.

Las estimaciones de MoMo pueden consultarse aquí: [Informes MoMo 2020](#)