

Informe epidemiológico sobre la situación de la yersiniosis en España. Año 2021.

Resultados de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Informe actualizado el 17 de julio 2023 con los datos disponibles hasta la fecha.

Depuración, validación y análisis de los datos:

Área de Análisis en Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII.

Área de Vigilancia de Salud Pública. Equipo SiViEs. Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII.

Vigilancia y notificación de los casos:

Unidades de Vigilancia de Salud Pública de las Comunidades Autónomas.

Cita sugerida: Informe epidemiológico sobre la situación de la yersiniosis en España. Año 2021. Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III.

Introducción

La yersiniosis es una infección entérica causada principalmente por dos especies del género *Yersinia*: *Yersinia enterocolitica* (siendo los serogrupos O3 y O9 los más frecuentemente aislados en Europa), y *Yersinia pseudotuberculosis* (que rara vez causa enfermedad en el ser humano). Todas las especies de *Yersinia* son zoonóticas, y la transmisión del microorganismo al ser humano se produce fundamentalmente por el consumo de alimentos contaminados. El principal reservorio de *Y. enterocolitica* son los cerdos, y las infecciones suelen producirse por el consumo de carne de cerdo poco cocinada o a la contaminación cruzada de otros alimentos con carne cruda de cerdo. El principal reservorio de *Y. pseudotuberculosis* son los roedores, los animales salvajes y las aves de caza, y las infecciones por este patógeno se asocian al consumo de vegetales contaminados.

La mayor parte de las infecciones por *Y. enterocolitica* causan un cuadro de enterocolitis, con síntomas que incluyen fiebre y dolor abdominal, que en algunas ocasiones puede afectar a la parte inferior derecha del abdomen y confundirse con una apendicitis (pseudoapendicitis). Además, si hay afectación de los ganglios linfáticos mesentéricos puede aparecer un cuadro de apendicitis aguda. La infección es más frecuente en población infantil. *Y. pseudotuberculosis* produce una enfermedad entérica indistinguible de la causada por *Y. enterocolitica*.

Los casos de yersiniosis son de declaración obligatoria en España desde 2015.

Métodos

Se analizaron los casos de yersiniosis del año 2021 notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).

Los casos declarados siguen las definiciones de caso y los criterios para su clasificación acordados por la RENAVE, únicamente se recogen casos confirmados.

Para la asignación de las variables mes y año se utilizó la fecha clave (fecha de inicio de síntomas o la más cercana en caso de no conocerla - fecha de diagnóstico, fecha de hospitalización, etc.).

El análisis de distribución geográfica se realizó considerando la Comunidad Autónoma (CA) de declaración del caso.


El cálculo de las incidencias acumuladas anuales se realizó utilizando como numerador el total de casos notificados durante ese año (excluyendo importados y residentes en el extranjero) y como denominador las cifras de población residente en España a día 1 de enero del año correspondiente obtenidas del Instituto Nacional de Estadística (INE), excluyendo del denominador las poblaciones correspondientes a las Comunidades Autónomas que no notificaron dicho año; además, para el cálculo de las incidencias por Comunidades Autónomas, se excluyeron del numerador los casos extracomunitarios.

Situación epidemiológica

Distribución temporal


Galicia no notificó yersiniosis en el año 2021, y Baleares no notificó este año ni tampoco los anteriores. Además, Cantabria no notificó en el año 2019, y Murcia se incorporó a la notificación en el año 2020.

En el año 2021 se notificaron 744 casos de yersiniosis, siendo la incidencia acumulada de 1,71 casos por 100.000 habitantes; no se notificaron casos importados (Figura 1).



Distribución geográfica

La Comunidad Autónoma que presentó mayor incidencia acumulada fue Navarra (con 6,24 casos por 100.000 habitantes), seguida de País Vasco (IA de 5,74), Cantabria (IA de 5,31) y C. Valenciana (IA de 2,87). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y La Rioja notificaron cero casos (Figura 2).



Características de los casos

La enfermedad afectó fundamentalmente a población infantil, notificándose las mayores IA en menores de 5 años, disminuyendo paulatinamente la IA según aumentó la edad. Además, no se observaron grandes diferencias en cuanto al sexo, siendo la razón hombre/mujer global de 1,18 (Figura 3).


La principal especie de Yersinia aislada fue *Y. enterocolitica* (581 casos, 99% de casos con información disponible); además, se notificaron 4 casos de *Y. pseudotuberculosis*. Se observaron diferencias en la edad de los casos según la especie de Yersinia aislada: la mediana de edad de los casos de *Y. enterocolitica* fue de 12 años (Rango intercuartílico: 3-30 años) mientras que para los casos de *Y. pseudotuberculosis* fue de 49 años (Rango intercuartílico: 33-72 años).



Calidad de los datos de la declaración de casos individualizados

La calidad de la cumplimentación de las variables se muestra en la figura 4. La edad y el sexo estaban disponibles para todos los casos. Se disponía de información sobre la especie de Yersinia causante de la infección en aproximadamente el 80% de los casos. Las variables autonomía del caso y autonomía de residencia del caso tuvieron una cumplimentación ligeramente superior al 70%. Se disponía de información sobre si el caso era importado, la hospitalización y la defunción en un 40-60% de los casos, y de si el caso estaba asociado a un brote en menos del 40% de los casos.

Figura 4.



Brotos

En el año 2021 se notificaron dos brotes de yersiniosis, con un total de 8 casos (no constando que ninguno de ellos tuviera que ser hospitalizado). Ambos brotes tuvieron lugar en el hogar privado; uno de los brotes fue alimentario (siendo el alimento sospechoso carne de cerdo), mientras que en el otro brote no se disponía de información sobre el mecanismo de transmisión. En ambos brotes la especie de *Yersinia* aislada fue *Y. enterocolitica*.

Conclusión

En el año 2021 se produjo un aumento de la incidencia acumulada de yersiniosis en España con respecto al año previo, volviendo a las cifras anteriores a la pandemia de COVID-19. El grupo de edad más afectado continuaron siendo los menores de 5 años, y no se observaron diferencias por sexo.