

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LOS CASOS DE MPOX EN ESPAÑA (antes denominada viruela del mono)

Datos extraídos de SiViES el 15/10/2024 a las 08:30h

A fecha de esta actualización se han notificado un total de 8.307 casos confirmados de mpox desde el inicio del brote en abril de 2022, procedentes de 17 Comunidades Autónomas. En la tabla 1 se muestra el número de casos acumulados por año y Comunidad Autónoma de notificación.

**Tabla 1. Nº de casos confirmados de mpox declarados en SiViES según año y CCAA de notificación**

CCAA	Total casos (%)	Casos 2022 (%)	Casos 2023 (%)	Casos 2024 (%)
Andalucía	1.018 (12,3)	884 (11,8)	37 (11,4)	97 (21,8)
Aragón	79 (1,0)	74 (1,0)	5 (1,5)	0
Asturias	61 (0,7)	59 (0,8)	2 (0,6)	0
Baleares	242 (2,9)	216 (2,9)	15 (4,6)	11 (2,5)
Canarias	181 (2,2)	176 (2,3)	0	5 (0,9)
Cantabria	38 (0,5)	36 (0,5)	0	2 (0,5)
Castilla La Mancha	83 (1,0)	66 (0,9)	3 (0,9)	14 (3,2)
Castilla y León	92 (1,1)	85 (1,1)	3 (0,9)	4 (0,9)
Cataluña	2.550 (30,7)	2.329 (31,0)	103 (31,0)	118 (23,6)
Extremadura	34 (0,5)	32 (0,4)	1 (0,3)	1 (0,2)
Galicia	130 (1,6)	122 (1,6)	2 (0,6)	6 (1,4)
Madrid	2.827 (34,0)	2.534 (33,7)	118 (36,5)	175 (38,8)
Murcia	104 (1,3)	89 (1,2)	10 (3,1)	5 (1,2)
Navarra	21 (0,3)	21 (0,3)	0	0
País Vasco	252 (3,0)	245 (3,3)	1 (0,3)	6 (1,4)
La Rioja	6 (0,1)	6 (0,1)	0	0
Comunidad Valenciana	589 (7,1)	547 (7,3)	26 (8,0)	16 (3,7)
<b>Total</b>	<b>8.307</b>	<b>7.521</b>	<b>326</b>	<b>460</b>

Con respecto a la última actualización del 8 de octubre se han notificado 25 casos más. Gracias al refuerzo de la vigilancia epidemiológica y notificación de casos por las Comunidades Autónomas, se ha declarado de forma retrospectiva casos correspondientes a diciembre de 2023 (1 caso), septiembre de 2024 (17 casos) y octubre de 2024 (7 casos).

A continuación, se describen las características de los casos notificados con fecha de inicio de síntomas desde el 01/01/2024 hasta el 15/10/2024 (fecha de cierre de este informe).

## 1. Características de los casos

En 2024 se han notificado 460 casos, de los que 429 (93,3%) disponían de fecha de inicio de síntomas. Las características de estos casos se muestran en la tabla 2. La mayor parte fueron 421 hombres (98,1%); la edad osciló entre 6 y 76 años, con una mediana de edad de 36 años (rango intercuartílico (RIC): 30-44 años). El 64,1% de los casos tenía entre 30 y 49 años y el 43,1% de los casos habían nacido en España.

**Tabla 2. Características demográficas de los casos de mpox declarados en SiViES**


Características demográficas	Nº de casos	Porcentaje
Sexo		
Hombre	421	98,1
Mujer	8	1,9
Grupos de edad		
Menor de 20	5	1,2
20-29	88	20,5
30-39	163	38,0
40-49	112	26,1
50-59	45	10,5
60 y más	16	3,7
Región de nacimiento		
España	185	43,1
Europa Occidental	9	2,1
Europa Central – Este	4	0,9
Latinoamérica	135	31,5
África del Norte y Oriente Próximo	4	0,9
África Subsahariana	3	0,7
Otros	4	0,9
Desconocido	85	19,8
<b>Total</b>	<b>429</b>	<b>100</b>

## 2. Características de la enfermedad

Las fechas de inicio de síntomas se observaron entre el 01/01/2024 y el 08/10/2024. La distribución de los casos por mes de inicio de síntomas se muestra en la figura 1.

La mediana en días entre la fecha de inicio del primer síntoma y la fecha de diagnóstico de confirmación por laboratorio fue de 7 días (RIC [4-10]) y respecto a la fecha de declaración a nivel de CCAA fue de 4 días (RIC [0-8]).

**Figura 1. Curva epidémica de casos confirmados según mes de inicio de síntomas, 2024**




Los siete casos con fecha de inicio de síntomas en octubre de 2024 han sido notificados en Cataluña.

**a) Aspectos clínicos**

Un total de 285 casos (66,4%) presentaron alguna sintomatología general a lo largo de su proceso clínico (fiebre, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o cefalea) siendo la fiebre la más frecuente (219 casos, 51,1%). Ciento noventa y un casos (44,5%) presentaron linfadenopatías localizadas. El exantema se localizó en la zona anogenital en 291 casos (67,8%), en la zona oral-bucal en 67 casos (15,6%) y en 214 (49,9%) en otras localizaciones (Figura 2).

**Figura 2. Manifestaciones clínicas de los casos de mpox, 2024**



Cuarenta y seis pacientes (12,2% de los 376 casos con información) presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico: infección bacteriana secundaria (19 casos), úlcera bucal (10 casos), infección corneal (4 casos), miocarditis (1 caso), proctitis (1 caso), úlcera genital (1 caso), celulitis (1 caso), faringoamigdalitis (1 caso) y 8 casos con otras complicaciones.

Hubo veintidós hospitalizaciones (5,1%). Todos ellos fueron hombres, con una mediana de edad de 32 años (RIC [27-41]). En los catorce casos en los que la fecha de ingreso y de alta está disponible, la estancia mediana en el hospital fue de 5 días (RIC [3-8]).

Se registró un caso que ingresó en UCI por una sepsis y que fue dado de alta a los 5 días.

### **b) Antecedentes personales**

Ciento treinta y ocho casos (34,7% de los 398 casos con información) eran personas diagnosticadas de infección por el VIH.

Dos pacientes presentaron otras causas de inmunosupresión.

Respecto a la vacunación, 396 casos (92,3%) no estaban vacunados o se desconocía su estado vacunal, 30 casos (7,0%) estaban vacunados frente a mpox en el contexto actual del brote y tres casos (0,7%) habían sido vacunados de la viruela en la infancia. De los 30 casos vacunados con vacuna frente a mpox, 8 (26,7%) recibieron una sola dosis, 20 (66,6%) dos dosis y en 2 (6,7%) casos se desconoce el número de dosis.

### **c) Datos de laboratorio**

Todos los casos fueron confirmados por PCR realizada en muestras de lesiones cutáneas (236 casos), líquido vesicular (125 casos), 16 casos en otras muestras y en 52 se desconoce esa información.

En 14 muestras analizadas, correspondientes a casos con inicio de síntomas en agosto y septiembre, se ha identificado el clado II.

## **3. Características de la exposición**

De los 359 casos con información, 65 (18,1%) reportaron un contacto estrecho con un caso probable o confirmado. Cincuenta y dos casos refirieron antecedente de viaje en los 21 días previos a la fecha de inicio de síntomas, aunque solo 12 fueron clasificados como casos importados. En 6 de los casos importados se dispone de información sobre el destino del viaje (Marruecos (2 casos), Estados Unidos (1 caso), Andorra (1 caso), República Checa (1 caso) y Serbia (1 caso)).

Se detectó un brote familiar con afectación de tres miembros de la familia. Ninguno de ellos requirió hospitalización.

El mecanismo de transmisión más probable se atribuyó a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual en 345 casos (80,4%), en 14 casos fue debido a un contacto estrecho en un contexto no sexual (3,3%) y en 70 casos esta información no estaba disponible (16,3%). Respecto a la orientación sexual de los afectados, excluyendo el caso del menor, 294 casos

(68,7%) eran hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres, 10 casos (2,3%) eran hombres heterosexuales, 5 casos (1,2%) eran mujeres heterosexuales y en 119 casos (27,8%) no constaba la información.

#### 4. Conclusiones:

- Se ha reforzado la vigilancia epidemiológica y se continúan notificando casos de mpox en España.
- No se observan cambios significativos respecto a las características clínicas y epidemiológicas de los casos con inicio de síntomas en 2024 respecto a los notificados previamente.

Debido a la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud el día 14 de agosto de 2024, la actualización de datos se está realizando de forma semanal. Los datos incluidos en este informe están en continua actualización a través de las notificaciones de las CCAA.