






Informe epidemiológico sobre la situación de la toxoplasmosis congénita en España.

Resultados de la notificación a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica los años 2019, 2020 y 2021.



Cita sugerida: Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Informe Epidemiológico sobre la situación de la toxoplasmosis congénita en España. Años 2019, 2020 y 2021. Madrid, 30 septiembre 2022

Antecedentes

La toxoplasmosis es una parasitosis infecciosa sistémica de distribución mundial.

Se contrae por la ingestión de quistes de *Toxoplasma gondii* y, aunque suele manifestarse de modo subclínico o con síntomas leves en personas inmunocompetentes, adquiere gran importancia si se infecta por primera vez una mujer embarazada. La afectación fetal (toxoplasmosis congénita) puede provocar abortos, sintomatología grave en recién nacidos e importantes secuelas de por vida.

Existen estudios que reflejan un descenso progresivo de la enfermedad en Europa en los últimos años, aun así, la prevalencia es variable dependiendo de los territorios, incluidas diferentes regiones en España. En otros continentes continúa siendo un grave problema de salud pública que exige un abordaje complejo para su prevención, tratamiento y control.

Situación epidemiológica en España

Durante los años 2019 y 2020 las Comunidades Autónomas no notificaron ningún caso de toxoplasmosis congénita a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).

En el año 2021 se registró un único caso confirmado en la provincia de Valencia correspondiente a una niña recién nacida.